

# Cerisier tardif

Prunus serotina

- **Hauteur maximale** : 3.00 - 10.00 m
- **Largeur maximale** : 2.00 - 8.00 m
- 
- **Type de feuillage** : Caduc
- **Couleur de floraison** : Blanc
- **Mois de floraison** : Avril Mai Juin
- **Origine** : Amérique
- **Autres critères** :
- **Critères négatif** : Plante invasive envahissante

## A savoir :

Le Cerisier tardif, appelé aussi Cerisier d'automne ou Cerisier noir, provient des États-Unis où il a de nombreuses utilisations : son bois sert en ébénisterie pour la fabrication de meubles mais aussi pour alimenter les feux de barbecue, les fruits sont quant à eux comestibles. Introduit en Europe en 1629 pour son intérêt commercial et ornemental, il est aujourd'hui reconnu comme plante invasive. Les feuilles fraîches sont toxiques pour le bétail ; il faut donc éviter la présence de cette essence en zone de pâturage.

- **Paysage** : Bocage Plateau cultivé Bord d'eau Vigne Coteaux Forêt/Lande
- **Contexte urbain** : Centre-bourg Périphérie Campagne
- **Type de sol** : Argileux Limoneux Sableux

- **Humidité de votre sol :** Sec Humide
- **Exposition :** Ombre Ensoleillé